



Pasta

Composición

	por 100 g
Yodoformo	15,8 g
Butoformo	25,7 g
Eugenol, Aceite de oliva, Aroma natural menta, Laurilsulfato sódico, Agua purificada, Carbonato cálcico, Penghawar djambi c.s.p.	100,0 g

Forma farmacéutica

Pasta alveolar.

Contenido

12 g

Categoría farmacoterapéutica

ALVOGYL asocia un principio activo antiséptico (yodoformo) y otro anestésico (butoformo) con un excipiente hemostático.

Titular de la autorización sanitaria

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur - Francia

Comercializado por

LABORATORIOS MAB DENTAL S.A.
C/ Córcega 116,
08029 Barcelona - España

Indicaciones terapéuticas

- Apósito alveolar tras extracción dental,
- Tratamiento preventivo o curativo del alveolo.

Contraindicaciones

- Sensibilidad idiosincrásica al yodo
- Alergia conocida a los derivados del ácido paraminobenzoico
- Posible alergia al eugenol y/o a uno de los constituyentes de la fórmula
- No utilizar ALVOGYL en niños menores de 12 años (dentadura definitiva).

Precauciones de empleo

El producto no es reabsorbible. Una vez aplicado, no se deberá suturar en ningún caso.
Respetar estrictamente el modo de utilización preconizado.
Advertir al paciente que no se enjuague la boca enérgicamente durante las 24 horas siguientes a la extracción.

Interacciones medicamentosas

Ninguna señalada hasta la fecha.

Advertencias especiales

Producto reservado exclusivamente para el uso del especialista en odontoestomatología.

Mujeres embarazadas o durante la lactancia

Ningún dato hasta la fecha.

Posología y modo de administración

Preparar una bolita que se coloca en el alveolo. El exceso de producto se elimina por sí solo.

No tratar más de 5 dientes en una sesión. Si fuera necesario, se podrá aplicar en otras zonas de extracción 8 días después.

Reacciones adversas

Riesgo de manifestación alérgica con sensibilización de grupo cruzado con los nuevos derivados del ácido paraminobenzoico (sulfamidas, ciertos anestésicos locales, ciertos conservantes, ciertos colorantes).
Posible alergia a uno de los constituyentes de la fórmula.

Caducidad

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Fecha de la última revisión del prospecto

01/09/94

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

